

APTO PARA TODOS LOS CULTIVOS

GREEN CABOR ZINC aporta nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. El calcio es un elemento que se encuentra en las paredes celulares y en la superficie interior de la membrana plasmática, siendo transportado principalmente por vía xilemática. La disponibilidad de calcio está relacionada directamente con las tasas de transpiración de las plantas.

Una deficiencia de boro inhibe significativamente la translocación del calcio y su distribución en el interior de la planta. Además, provoca cambios anormales en el metabolismo de la célula, ya que ambos elementos son responsables de la estructura de paredes y membranas celulares.

GREEN CABOR ZINC previene estados carenciales de boro y zinc. Evita la reducción del tamaño de la hoja, la clorosis internerval y la disminución del crecimiento de la planta. Conjuntamente, amortigua el estrés sufrido por la planta debido a bajas temperaturas.

Asimismo, el contenido de aminoácidos de **GREEN CABOR ZINC** mejora la absorción de los nutrientes y a su vez aporta un extra de vitalidad para nuestros cultivos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS (% p/v)

Calcio (CaO)	7,1% p/v	Aminoácidos libres	2,4% p/v
Boro (B)	0,6% p/v	Materia orgánica	23,2% p/v
Zinc (Zn)	0,6% p/v	Carbono orgánico	13,5% p/v

APARIENCIA

Líquido marrón oscuro

CARACTERÍSTICAS

Densidad: 1,18 g/cm³
pH: 5,92

DOSIS Y APLICACIONES

Cultivos	Aplicación	Frecuencia
Cítricos y frutales:	2,5 cc/l de agua	Desde el cuajado hasta una semana antes de la recolección
Hortícolas, papa, frutilla:	2,5 cc/l de agua	durante todo el ciclo. En cultivo protegido, empezar 9-10 días Después del cuajado y continuar en intervalos de 7-10 días aplicar durante todo el ciclo vegetativo.
Flores y ornamentales:	2,5 cc/l de agua	Después del cuajado y continuar durante todo el ciclo.
Frutales tropicales:	2,5 cc/l de agua	Desde el cuajado hasta una semana antes de la recolección

Cultivos	Fertirrigación	Frecuencia
Cítricos y frutales:	8 L/ha	Desde el cuajado hasta una semana antes de la recolección.
Hortícolas, papa y frutilla:	5 L/ha	Después del cuajado y continuar durante todo el ciclo vegetativo.
	5 L/ha	Después del cuajado y continuar durante todo el ciclo del cultivo.
Flores y ornamentales:	8 L/ha	Cuando el fruto recién cuajado tiene 2 mm. Repetir cada 15 días.
Frutales tropicales:		

INCOMPATIBILIDADES

GREEN CABOR ZINC es compatible con la mayoría de fertilizantes y productos Fitosanitarios normalmente utilizados a excepción de productos de pH muy alcalinos (superior a 10), o muy ácidos (inferior a 2). Se recomienda hacer una pequeña prueba antes de su aplicación.

PRESENTACIÓN: 250 ml 500 ml, 1L, 5 L y 20 L

AGRI nova Science S.A. Avda.
Carlos III, no 80 04721- El
Parador Almería, Spain
Tel.+34 950 347 760
comercial@agri-nova.com
www.agri-nova.com



ISO 9001:2008 Diseño, fabricación, comercialización y distribución de fertilizantes para la agricultura.
ISO 14001:2004 Comercialización y distribución de fertilizantes para la agricultura.

Importado y distribuido por:
AGRI nova Science Ecuador,
S.A. Panamericana Norte Km 5
½ y Avellaneda
Bodegas Parkenor, Bodega B
96-97
Carcelén Industrial - Quito

N° Registro Producto:
057-F-AGR-P-CL-001

