

SIGAZOL

REGISTRO N° 67-F24/NA

TITULAR: AGRINOVA SCIENCE ECUADOR S.A.

Ingrediente activo:

Difenoconazole

Concentración:

Difenoconazole 250 g/l

Uso: Fungicida

Formulación: Concentrado Emulsionante -EC

Clasificación Toxicológica: III-Ligeramente Peligroso

Modo de Acción

Es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa.

Mecanismo de Acción

SIGAZOL actúa como inhibidor de la desmetilación del esteroles. Inhibe la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo de los hongos, pertenece al grupo de los Triazoles.

Modo de Empleo

Aplicar en aspersiones y cubrir totalmente la planta.

Recomendaciones de Uso

Cultivo	Plaga	Dosis	Periodo de carencia
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Micosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i>)	0.4 l/ha	1 día
Tomate riñón (<i>Lycopersicon</i> <i>esculentum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.4 l/ha	3 días

AGRINOVA SCIENCE ECUADOR S.A

Panamericana norte Km 5 ½ y Avellaneda, Conjunto PARKENOR, Bodega B 96-97, Carcelén Industrial-Quito.
Vía Daule, Parque California 1, Bodega G9-Guayaquil.

Época y Frecuencia de Aplicación

En Banano se recomienda realizar 3 aplicaciones con un intervalo de 14 días cuando las plantas presenten los primeros estados de la enfermedad. Para el cultivo de Tomate riñón se lo debe aplicar 2 veces en presencia de la plaga.

Periodo de Reingreso

No ingresar en las áreas tratadas durante un período de 24 horas, después de la aplicación.

Fitotoxicidad

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas.

Compatibilidad

Este producto es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y acaricidas. Por seguridad realizar previamente una prueba de compatibilidad (pequeña escala).

Presentaciones Comerciales

SIGAZOL cuenta con registro para las siguientes presentaciones: 1 L.
